

Comunicado a los Padres y Apoderados.

Vacunación Escolar 2014

❖ Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar, comunicamos a ustedes que a partir del mes de Septiembre, se realizará la vacunación escolar correspondiente al año 2014, fecha que se les avisará con anticipación por su Profesor Jefe.

Las vacunas a administrar este año son:

- ✚ **1° básico:** Tres Vírica y Dpt acelular.
- ✚ **4° básico:** a partir de éste año 2014 se incorpora la vacuna contra el Virus Papiloma Humano (VPH) a niñas de 4° año básico, las que recibirán un refuerzo posteriormente cuando pasen a 5° básico.
- ✚ **8° básico:** Dpt acelular.

Al igual que años anteriores estas vacunas serán administradas por personal debidamente capacitado de nuestro Cefam Violeta Parra, que tiene las competencias técnicas para realizar esta actividad, lo cual nos asegura que el proceso se llevará a cabo cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad hacia vuestros hijos, lo cual siempre nos ha caracterizado.

Sin embargo dichas vacunas podrían tener algunas contraindicaciones y efectos secundarios, es por ésta razón que adjunto a éste comunicado información relevante para ésta Campaña.

Al igual que los medicamentos, las vacunas tienen algunas contraindicaciones para su administración como: alergia a algunos de sus componentes y enfermedades febriles graves.

Esta intervención de nuestro Cefam Violeta Parra, requiere de su colaboración para prevenir éstas enfermedades, por lo cual solicitamos que su hijo/a asista al establecimiento el día señalado, y enviar a su Profesor/a Jefe, destacando alguna observación relevante que necesite dar a conocer.

NOTA: Favor avisar a su Profesor si su hijo fue vacunado con algunas de éstas vacunas el año pasado.

ATTE.



Harlem Venegas Grollmus.

Enfermera Supervisora

Fono: 587050 – Anexo Minsal 427050

harlem.venegas@redsalud.gov.cl

Visita: www.serviciodesaludnuble.cl

ACTUALIZACIÓN MINUTA VACUNACIÓN ESCOLAR 2014.

VACUNA TRESVÍRICA: Es una vacuna a virus vivo atenuado, contra el Sarampión, Parotiditis (Paperas) y la Rubéola.

EFICACIA E INMUNOGENICIDAD: Produce inmunidad en más del 95% de los receptores de la vacuna, con persistencia de la inmunidad por más de 20 años.

INDICACIÓN: 1 Año de edad y un refuerzo en 1° básico.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Déficit inmunitario, historia de anafilaxia con dosis previa, fiebre sobre 38.5°C y embarazadas.

REACCIONES POST VACUNA: A partir del 5° día puede observarse reacciones leves como fiebre, síntomas rinofaríngeos leves o exantema discreto.

DOSIS: 0.5 ml por vía subcutánea. Zona de punción; tercio medio del brazo derecho, la vacuna reconstituida se debe utilizar inmediatamente.

(Decreto de vacunación N°6, del Ministerio de Salud Enero de 2010.)

VACUNA TRIPLE DPaT: Vacuna combinada contra difteria, tétanos y pertussis acelular.

INDICACIONES: Vacunación de refuerzo contra Tétanos, Difteria y tos convulsiva en los niños de 1° básico y en jóvenes de 8° año Básico

En resumen Niños primero básico reciben; Tresvírica y DPTa.

Niños octavo básico: reciben un refuerzo de DPTa.

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD: Aproximadamente 10 años para Tétanos y 5 años para Difteria (cuando se ha completado el esquema de 3 dosis de DPT y 1 refuerzo con DPT).

CONTRAINDICACIONES: Fiebre sobre 38.5°C, alergia u otras complicaciones comprobadas a algún componente de la vacuna en administraciones anteriores. Inmunodepresión

REACCIONES POST VACUNA: Principalmente dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de punción por 1 a 2 días. En algunos casos se puede presentar fiebre durante 24 a 48 hrs.

DOSIS: 0.5 ml por vía Intramuscular. Zona de punción: tercio superior del brazo, generalmente músculo deltoides, brazo izquierdo.

Vacunación contra virus papiloma humano (VPH). Desde el 2014, se aplicará en Chile en todos los colegios y escuelas la vacunación contra el virus papiloma humano (VPH) a niñas de 4° año básico, las cuales recibirán un refuerzo posteriormente cuando pasen a 5° básico. Según decreto exento 1201 del 22/11/2013 del Ministerio de salud.

Lo anterior, con el objeto de prevenir y evitar la infección por este virus. El VPH es uno de los virus causantes, más a largo plazo de cáncer cervico uterino en mujeres*.

CARACTERÍSTICAS: La vacuna VPH contiene 4 genotipos del virus (tetavalente), se administra en músculo deltoides por vía intramuscular (IM). Reacciones esperadas es una vacuna bien tolerada y las reacciones son leves, cerca de 1% puede presentar fiebre, dolor y eritema. (rojo en el sitio de punción)

En la región del Bio Bio este año, se espera vacunar 14.000 niñas de 4° básico.

*En Chile el Cáncer cervicouterino mata a más de 600 mujeres al año, es 2° causa de muerte por cáncer mujeres edad reproductiva. Tasa mortalidad 7.6/100.000 mujeres, cuatro veces mayor que países desarrollados, con marcada estratificación social.